

ЗОРОВІ ФУНКЦІЇ

Опис показників функціональної системи

ГОСТРОТА ЗОРУ

Оцінка гостроти зору базується на відповідній лінії в таблиці Снеллена з відстані 20 футів (5 метрів), для якої пацієнт робить не більше однієї помилки, використовуючи найкращу доступну корекцію. Крім того, можна оцінити найкраще скоригований зір поблизу, але це слід зазначити в записах та регулярно виконувати під час подальших оглядів. Під час подальших оглядів слід уникати переходу від вимірювання гостроти зору поблизу до вимірювання гостроти зору вдалину.

ПОЛЯ ЗОРУ

- 0 норма
- 1 лише ознаки: дефіцити проявляються лише при безпосередній («обличчям до обличчя») перевірці
- 2 помірний (дефіцит): пацієнт усвідомлює наявність дефіциту, проте, неповна геміанопсія при огляді
- 3 явний: повна гомонімна геміанопсія або її еквівалент

СКОТОМА

- 0 відсутня
- 1 незначна: виявляється лише при безпосередній («обличчям до обличчя») перевірці
- 2 значна: повідомлення пацієнта з власної ініціативи

БЛІДІСТЬ ДИСКА ЗОРОВОГО НЕРВА

- 0 відсутня
- 1 присутня

ПРИМІТКА:

Під час визначення кроку EDSS показник оцінки зорової функції слід перевести в нижчі значення наступним чином:

Показник зорової функції (ФС)	6 5 4 3 2 1
Значення показника зорової функції після перетворення	4 3 3 2 2 1