

ФУНКЦІЇ СТОВБУРА ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Опис показників функціональної системи

ПОРУШЕННЯ РУХІВ ОЧНИХ ЯБЛУК (РОЯ)

- 0 відсутні
- 1 лише слабкі прояви: незначна та ледь помітна клінічно слабкість РОЯ, пацієнт не скаржиться на розмитість зору, диплопію чи дискомфорт
- 2 слабкі порушення: ледве клінічно помітна слабкість РОЯ, яку пацієнт усвідомлює; або очевидний неповний параліч будь-якого руху очей, про який пацієнт не знає
- 3 помірні: очевидний неповний параліч будь-якого руху очей, який пацієнт усвідомлює; або повна втрата руху погляду в одному напрямку на будь-якому оці
- 4 явні порушення: повна втрата руху погляду в більш ніж одному напрямку на будь-якому оці

НІСТАГМ

- 0 відсутній
- 1 лише ознаки або легкий ступінь: ністагм, що провокується поглядом, нижче межі «помірного» (еквівалент показника ФС стовбура мозку 1)
- 2 помірний ступінь: стійкий ністагм при горизонтальному або вертикальному погляді під кутом 30 градусів, але не в первинному положенні, пацієнт може усвідомлювати наявність порушення, але може й не знати про нього
- 3 тяжкий ступінь: стійкий ністагм у первинному положенні або явний стійкий ністагм у будь-якому напрямку, що заважає гостроті зору; повна між'ядерна офтальмоплегія зі стійким ністагмом при відведенні ока; осцилопсія

УРАЖЕННЯ ТРІЙЧАСТОГО НЕРВА

- 0 відсутні
- 1 лише ознаки (порушень)
- 2 легкий ступінь: клінічно виявляється оніміння, яке пацієнт усвідомлює
- 3 помірний: порушення розрізнення відчуття гострого/тупого в одній, двох або трьох гілках трійчастого нерва; невралгія трійчастого нерва (принаймні один напад за останні 24 години)
- 4 виражені порушення: нездатність розрізнити відчуття гострого/тупого або повна втрата чутливості у всіх гілках одного чи обох трійчастих нервів

СЛАБКІСТЬ М'ЯЗІВ ОБЛИЧЧЯ

- 0 відсутня
- 1 лише ознаки
- 2 легкий ступінь: клінічно виявляється слабкість лицьових м'язів, яку пацієнт усвідомлює
- 3 помірний ступінь: неповний лицьовий параліч, такий як слабкість закривання очей, через що пацієнт потребує використання пов'язки на очі для нічного сну або слабкість закриття рота, що призводить до слинотечі

4 виражена слабкість: повний односторонній або двобічний параліч обличчя з лагофталмом або труднощами з проковтуванням рідин

ПОРУШЕННЯ СЛУХУ

0 відсутнє

1 лише ознаки: пацієнт гірше чує клацання пальців з одного чи з обох боків і має різні результати тесту Вебера з одного та з іншого боку, проте не скаржиться на проблеми зі слухом

2 легкі порушення: так само, як вказано у пункті 1, але пацієнт усвідомлює наявність проблем зі слухом

3 помірні: не чує клацання пальців з одного чи з обох боків, не чує деякі цифри, вимовлені пошепки

4 виражені порушення: не чує всі або майже всі цифри, вимовлені пошепки

ДИЗАРТРИЯ

0 відсутня

1 лише ознаки

2 легкий ступінь: клінічно виявляється дизартрія, про яку хворий знає

3 помірний ступінь: явна дизартрія під час звичайної розмови, що погіршує розбірливість

4 виражена: мова нерозбірлива

5 нездатність розмовляти

ДИСФАГІЯ

0 відсутня

1 лише ознаки

2 легкий ступінь: труднощі з проковтуванням рідких рідин (не в'язких)

3 помірний: труднощі з проковтуванням рідин і твердої їжі

4 виражений: постійні труднощі з ковтанням; потрібна дієта з протертою їжею

5 повна втрата здатності ковтати їжу

ФУНКЦІЇ ІНШИХ ЧЕРЕПНИХ НЕРВІВ

0 нормальні

1 лише ознаки

2 легка інвалідизація: клінічні прояви дефіциту, який пацієнт зазвичай усвідомлює

3 помірна інвалідизація

4 виражена інвалідизація