

ФУНКЦІЇ КИШЕЧНИКА І СЕЧОВОГО МІХУРА

Опис показників функціональної системи

УТРУДНЕНИЙ ПОЧАТОК СЕЧОВИПУСКАННЯ І ЗАТРИМКА СЕЧІ

- 0 відсутні
- 1 легкі прояви: відсутність значного впливу на спосіб життя
- 2 помірні: затримка сечі; часті інфекції сечовивідних шляхів
- 3 тяжкий ступінь: потреба у катетеризації
- 4 втрата функції: нетримання сечі внаслідок переповнення сечового міхура

ІМПЕРАТИВНИЙ ПОТЯГ ДО СЕЧОВИПУСКАННЯ ТА НЕТРИМАННЯ СЕЧІ

- 0 відсутні
- 1 легкі прояви: відсутність значного впливу на спосіб життя
- 2 помірний ступінь: рідкісні випадки нетримання, що бувають не частіше одного разу на тиждень; пацієнту доводиться використовувати прокладки
- 3 тяжкий ступінь: часте нетримання сечі, що буває від кількох разів на тиждень до більш ніж одного разу на день; пацієнту доводиться носити сечоприймач або використовувати прокладки
- 4 втрата функції: втрата контролю над сечовим міхуром

КАТЕТЕРИЗАЦІЯ СЕЧОВОГО МІХУРА

- 0 відсутня
- 1 періодична самокатетеризація
- 2 встановлений постійний катетер

ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ КИШЕЧНИКА

- 0 відсутні
- 1 легкі: відсутність нетримання, відсутність значного впливу на життя, незначні закрепи
- 2 помірні: пацієнту доводиться використовувати прокладки або змінити спосіб життя так, щоб увесь час перебувати неподалік від туалету
- 3 тяжкі: потреба в клізмі або ручних методах випорожнення кишечника
- 4 повна втрата функції

ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ФУНКЦІЇ

Чоловіки

- 0 порушення відсутні
- 1 легкі порушення: труднощі з підтриманням ерекції під час статевого акту, але ерекція досягається і статевий акт відбувається
- 2 помірні: труднощі з виникненням ерекції, зниження лібідо, проте статевий акт відбувається і пацієнт досягає оргазму

3 тяжкі: виражене зниження лібідо, нездатність досягти повної ерекції, утруднений статевий акт та гіпооргазмія

4 втрата функції

0	порушення відсутні
1	легкі: незначна відсутність змащення, проте все ще сексуально активна і досягає оргазму
2	помірні: диспареунія, гіпооргазмія, зниження статевої активності
3	тяжкі: виражене зниження статевої активності, аноргазмія
4	втрата функції

Під час визначення показників кроку EDSS показник оцінки функції кишечника і сечового міхура слід перетворити в нижчі значення наступним чином:

Показники функції кишечника і сечового міхура після перетворення 5 4 3 3 2 1

Порушення статевої функції можна зафіксувати на листку для підрахунку балів, але загалом ці дані не впливають на показники функціональної системи через очевидні труднощі в оцінці для лікаря, який проводить обстеження