

ЦЕРЕБРАЛЬНІ (КОГНІТИВНІ) ФУНКЦІЇ

Опис показників функціональної системи

ДЕПРЕСІЯ І ЕЙФОРІЯ

0 відсутні

1 присутні: пацієнт скаржиться на депресію або лікар чи близька людина вважають, що у нього є ознаки депресії або ейфорії

Показники кроку «депресія і ейфорія» заносяться у листок для підрахунку балів, проте їх не слід брати до уваги при визначенні результатів ФС і EDSS

ПОГІРШЕННЯ РОЗУМОВИХ ФУНКЦІЙ

0 відсутні

1 лише ознаки: обстеження виявляє ознаки, про які пацієнт або близька людина не підозрює

2 легкі: пацієнт та/або його близька людина повідомляють про незначні зміни в розумових функціях. Приклади включають наступне: порушення здатності до слідування за швидкою зміною асоціацій та розуміння складних питань; порушення здатності робити правильні висновки в певних вимогливих ситуаціях; пацієнт здатний занотувати від руки рутинні повсякденні справи, але не може переносити додаткові стресори; періодично виникають симптоми навіть при нормальному рівні стресу; знижена працездатність; схильність до недбалості через забудькуватість або втому

3 помірні: певні аномалії при короткому тестуванні психічного статусу, але пацієнт все ще орієнтований в своїй особі, місці та часі

4 виражені: пацієнт не орієнтується в одній або двох сферах (особа, місце чи час), є виражений вплив на спосіб життя

5 деменція, сплутаність свідомості та/або повна дезорієнтація

ПІДВИЩЕНА ВТОМЛЮВАНІСТЬ

0 відсутня

1 легкий ступінь: зазвичай не заважає повсякденній діяльності

2 помірний ступінь: заважає, проте не обмежує повсякденну діяльність більш ніж на 50 %

3 тяжкий ступінь: значне обмеження повсякденної діяльності (зниження більш ніж на 50 %)

Оскільки втомлюваність важко оцінити об'єктивно, деколи вона не береться до уваги при оцінці мозкової ФС або підрахунку кроку EDSS. Будь ласка, дотримуйтеся конкретних інструкцій.